



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2025
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, 26 DE SETEMBRO DE 2024

RESPOSTA(S) AO(S) RECURSO(S) CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 82

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: Na faixa etária em questão – acima de 100 anos –, trata-se da maior longevidade feminina determinada por um cumulativo de causas que atuam em faixas etárias diferentes. Causas externas, doenças cardiocirculatórias, doenças infecciosas ou neoplásicas, sozinhas, não são responsáveis pela presença de um número quase três vezes maior de mulheres em relação a homens na faixa centenária. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 85

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: A paciente Dona Alice deverá ser acompanhada na própria unidade no Programa Hipertensão nas situações de hipertensão permanente, esporádica ou em crises ou do avental branco, onde receberá ajustes de medicação, orientações de controle de dieta, controle de estresse, entretenimento e outras. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 88

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: A introdução da vacinação contra dengue no calendário vacinal em sua implantação inicial prevê a escolha de municípios com maiores incidência de dengue grave, o que inclui casos com manifestações hemorrágicas, e, para a faixa etária citada, é a proposta inicial do Ministério da Saúde para esse importante problema de saúde. A assertiva correta (municípios com características epidemiológicas graves) – alternativa C – é mantida. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2025
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, 26 DE SETEMBRO DE 2024

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 89

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: Ao utilizar equipamento de proteção individual, Dona Raimunda previne doenças transmissíveis por atividade profissional e por via alimentar, como hepatite A. Portanto, trata-se de prevenção primária com proteção específica. Assim, o gabarito, alternativa “C”, está mantido. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 90

RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO

PARECER: Por considerar pertinentes os argumentos apresentados nos recursos, a banca decidiu ANULAR a questão.

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 92

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: Algumas doenças têm tido, de fato, aumento de incidência em algumas regiões ou localidades, outras, como o sarampo, tiveram reintrodução no Brasil e novo declínio com a mudança de políticas públicas, como por exemplo, a retomada dos esforços em vacinação. Porém, ainda se tem como conceito a tendência de declínio das doenças infecciosas. Assim, o gabarito, alternativa “E”, está mantido. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 93

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: Na ESF, os pacientes com transtornos mentais receberão assistência clínica e de transtornos mentais na própria unidade, devendo ser encaminhados para eMulti ou atenção especializada em psicologia e psiquiatria apenas os casos que dispensem atendimento especializado. Assim, o gabarito, alternativa “C”, está mantido. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2025
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, 26 DE SETEMBRO DE 2024

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 94

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: Desde 2017, o Ministério da Saúde do Brasil adota uma única dose da vacina antiamarílica, a partir dos nove anos de idade, devendo a vacina ser ministrada em qualquer unidade de saúde municipal. Assim, o gabarito, alternativa “D”, está mantido. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 95

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: As próteses são utilizadas para recuperação ou reabilitação de função perdida definitivamente, portanto trata-se de prevenção terciária. Assim, o gabarito, alternativa “C”, está mantido. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 96

RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO

PARECER: A partir de novembro de 2024 a vacinação contra a poliomielite será realizada com três doses da VIP, seguidas por dose de reforço com VIP. Com efeito, por considerar pertinentes os argumentos apresentados nos recursos, a banca decidiu RETIFICAR o gabarito, de “A” (Gabarito Oficial Preliminar) para “B” (Gabarito Oficial Definitivo).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 97

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: O diagnóstico de estrogiloidíase pode ser facilmente realizado com o método de pesquisa de larvas rabditoide que deve ser realizado em regiões com precariedade de condições socio sanitárias e em pacientes com dor abdominal epigástrica e eosinofilia importante. A teníase pode ser diagnosticada por métodos de pesquisa de ovos nas fezes e raramente pelo método da fita gomada, a qual não se encontra disponível como método de rotina. Assim, o gabarito, alternativa “C”, está mantido. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2025
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, 26 DE SETEMBRO DE 2024

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 99

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

PARECER: A argumentação apresentada pelos(as) impetrantes dos recursos não deixa de refletir as diretrizes vigentes de manejo do HIV, que preconizam a importância do **início precoce da terapia antirretroviral (TARV)** para todos os indivíduos diagnosticados, independentemente da contagem de LT-CD4.

O protocolo brasileiro preconiza o seguinte: “A TARV deve ser iniciada **no mesmo dia ou em até 7 dias após o diagnóstico**” PCDT (2023, p. 28), como mostra a imagem a seguir. Na alternativa “A”, indicada como correta, a expressão “até 7 dias” reforça ainda mais a ideia de precocidade e não a ideia de restrição.

A TARV deve ser iniciada no mesmo dia ou em até 7 dias após o diagnóstico

As vantagens da TARV devem estar claras para a PVHA, e que após seu início, não deve ser interrompida. O acolhimento e o cuidado compartilhado pela equipe multidisciplinar é essencial e a abordagem individualizada deve ser estabelecida até que a pessoa esteja adaptada e familiarizada com seu tratamento.

Os profissionais devem estar preparados para identificar barreiras estruturais e sociais que possam impactar na adesão ao tratamento e no cuidado contínuo, entre elas: estigma social, preconceito, racismo, insegurança alimentar, entre outras. Devem também ter tranquilidade em iniciar a TARV mesmo antes dos resultados de CD4 e CV.

O acolhimento, o cuidado compartilhado e o início rápido da TARV favorecem a vinculação e a retenção do usuário ao serviço de saúde^{31,32}, pilares centrais do cuidado contínuo às PVHA. Ademais, contribui para a obtenção da carga viral indetectável mais rapidamente, impactando na resposta imunológica, na morbidade, na mortalidade e na cadeia de transmissão do



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



28

Vale ressaltar também que “a Organização Mundial de Saúde recomenda que a TARV seja iniciada em até 7 dias” (PCDT 2023, p. 30). Por fim, a questão avaliada não contraria o princípio de início imediato da TARV e está plenamente alinhada às recomendações vigentes. Dessa forma, a questão deve ser mantida como correta em sua formulação e resposta indicada, pois está pautada no PCDT (2023) de HIV/aids.

Alternativas Incorretas:

(B) – A alternativa “B” está incorreta porque, apesar de a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) ser uma medida importante de saúde pública para a prevenção do HIV, ela **não está amplamente divulgada**, especialmente



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2025
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, 26 DE SETEMBRO DE 2024

em áreas periféricas. Portanto, é incorreto afirmar que a PrEP está amplamente divulgada nesses contextos. Para que essa afirmação fosse verdadeira, seria necessário um investimento maior em políticas públicas de divulgação e acesso, especialmente voltadas para populações periféricas, que são mais vulneráveis ao HIV.

(C) – No panorama epidemiológico atual (2024) da sífilis observa-se o contrário, ou seja, um aumento significativo do número de casos. Portanto, afirmar que houve uma queda nos casos de sífilis está em desacordo com a realidade. Pelo contrário, os casos têm aumentado, e a doença permanece um grande desafio para a saúde pública que requer atenção redobrada em estratégias de prevenção e controle.

(D) – A alternativa **“D”** afirma que o tratamento da tuberculose (TB) deve ser iniciado concomitantemente ao uso da terapia antirretroviral (TARV). No entanto, isso não é recomendado pelo PCDT. Portanto, a alternativa **“D”** não pode ser considerada universalmente correta, porque se preconiza primeiramente o início do esquema para tuberculose, e só após 7 dias deve-se iniciar a TARV (PCDT, 2023, p. 17).

(E) – A descentralização implica o atendimento dos casos simples na APS. Já os casos complexos de HIV/aids continuam sendo manejados nos SAEs (Serviço de atendimento especializado). Portanto, estes não serão extintos como mencionado.

Com base nessa argumentação, a alternativa **“A”** é ratificada como a correta, conforme o Gabarito Oficial Preliminar explícita. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2025
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, 26 DE SETEMBRO DE 2024

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO/MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

QUESTÃO: 100

RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO

PARECER:

Reproduzimos a questão a seguir, indicando com tarja amarela a alternativa CORRETA.

100. A tuberculose e a hanseníase são as principais doenças infectocontagiosas manejadas na atenção primária em saúde (APS). Sobre seu manejo, é correto afirmar:

(A) A cultura + TS (teste de sensibilidade) atualmente é rotina na APS devido aos novos casos de resistência aos tuberculostáticos do esquema básico.

(B) A vantagem do TRM-TB (teste rápido molecular para tuberculose) do escarro, além do diagnóstico, é a sensibilidade ou resistência à rifampicina, que auxilia bastante o clínico.

(C) Hoje, tem-se o TPT (tratamento preventivo da tuberculose) nos casos de ILTB (infecção latente por tuberculose), cuja primeira escolha é o esquema 9H (Isoniazida).

(D) Na hanseníase, o esquema PQT-U (polioquimioterapia única) é utilizado para os casos multibacilares e de resistência à clofazimina.

(E) As formas indeterminadas e dimorfas da hanseníase são consideradas multibacilares, diferentemente das formas tuberculoide e virchowiana, que são paucibacilares.

Com efeito, por considerar pertinentes os argumentos apresentados nos recursos, a banca decidiu RETIFICAR o gabarito, de “E” (Gabarito Oficial Preliminar) para “B” (Gabarito Oficial Definitivo).